

LEFLUNOMIDE MEDAC – INFORMÁCIE PRE PACIENTA

Vážená pacientka, vážený pacient,

tento prehľad základných informácií dostávate, vzhľadom na to, že Vám Váš lekár predpísal Leflunomide medac. Prosíme Vás, pozorne si prečítajte všetky uvedené informácie a informácie pre pacientov priložené k lieku.

ČAKÁTE DIEŤA ALEBO CHCETE OTEHOTNIET'

Ako väčšina liekov skupiny DMARD (antireumatiká modifikujúce ochorenie), Leflunomide medac môže tiež negatívne ovplyvniť vývoj nenarodeného dieťaťa.

INFORMÁCIE PRE ŽENY VO FERTILNOM VEKU, KTORÉ CHCÚ OTEHOTNIET'

U ešte nenarodeného dieťaťa môžu nastať vážne vývojové poruchy:

- Ak ste tehotná a užívate Leflunomide medac.
- Ak užívate Leflunomide medac a otehotníte počas liečby.
- Ak otehotníte bez prerušenia liečby Leflunomidom medac a bez ukončenia vymývacieho postupu popísaného nižšie.
- Ak otehotníte skôr ako do 2 rokov od ukončenia liečby Leflunomidom medac (bez predchádzajúceho vymývacieho postupu).

Nasledujúce preventívne opatrenia sú pri užívaní Leflunomidu medac mimoriadne dôležité:

- Pred začiatkom liečby sa presvedčte, či nie ste tehotná.
- Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby Leflunomidom medac a 2 roky po nej užívať spoľahlivú antikoncepciu.
- Ak plánujete otehotniť, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi. Nesmiete ďalej užívať Leflunomide medac a musíte
 - 2 roky počkať, alebo
 - absolvovať vymývacie postupy popísané nižšie na urýchlenie odstránenia Leflunomidu medac z Vášho organizmu.

- Prosíme Vás, aby ste bezodkladne informovali svojho lekára, ak počas liečby Leflunomidom medac alebo do 2 rokov od ukončenia liečby máte pocit, že by ste mohli byť tehotná (napr. ak sa Vám oneskorí menštruácia).

VYMÝVACÍ POSTUP PO LIEČBE LEFLUNOMIDOM MEDAC

Skôr než otehotníte, musíte mať úplnú istotu, že Leflunomide medac bol takmer úplne eliminovaný z Vášho organizmu. Môže to trvať až 2 roky. Túto čakaciu dobu možno skrátiť užívaním určitých liekov urýchľujúcich elimináciu Leflunomidu medac z organizmu.

Po užívaní týchto liekov musia po dobu 11 dní dva krvné testy v intervale najmenej 14 dní potvrdiť, že účinná látka bola z Vášho organizmu dostatočne eliminovaná. Potom, ako test preukáže, že Leflunomide medac bol z Vášho organizmu eliminovaný, musíte pred otehotnením počkať najmenej ďalší mesiac.

Ak sú krvné hladiny stále príliš vysoké, a to aj po vymývacom postupe, môže byť nevyhnutné postup zopakovať.

INFORMÁCIE PRE MUŽOV

Pri liečbe Leflunomidom medac hrozí, že prenikne do spermií a poškodí ešte nenarodené dieťa. Preto musia muži pri užívaní Leflunomidu medac používať spoľahlivú antikoncepciu.

Ak ste liečený Leflunomidom medac a plánujete stať sa otcom, obráťte sa na svojho lekára. Váš lekár Vám odporučí zastaviť užívanie Leflunomidu medac a absolvovať vyššie popísaný vymývacie postup. Po tomto postupe musia dva krvné testy v intervale 2 týždňov potvrdiť, že účinná látka bola z Vášho organizmu dostatočne eliminovaná. Na minimalizáciu rizika by ste mali pred splodením dieťaťa počkať ešte najmenej ďalšie 3 mesiace.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na svojho lekára.